

平成 年度

【丹波大納言小豆 栽培履歴】

氏名：( )

提出日 平成 年 月 日

住所：(丹波市 町 ) TEL( - )

圃場面積	a	圃場地番	
------	---	------	--

確認月日	担当者名	確認印	検印	検印
月 日				

◆作業履歴

作業名	作業月日	備考
圃場準備	月 日	
は種	月 日	
間引き	月 日	
補植	月 日	
中耕培土	月 日	
	月 日	
	月 日	
	月 日	
	月 日	
	月 日	
	月 日	
	月 日	
	月 日	
	月 日	
	月 日	

◆防除基準

薬剤名	対象病害虫	使用基準(JA丹波ひかみ特産物栽培ごよみより)		
		希釈倍率・使用量	使用時期	使用回数
キヒゲンR-2フロアブル	苗立枯病、ハト・カラス、タネバエ	原液20ml/種子1kg	は種前	1回
ダイアジノン粒剤	タネバエ、コガネムシ類幼虫	4~6kg/10a	は種時	1回
フェニックス顆粒水和剤	ヨトウムシ	2000~6000倍	8月下旬・9月下旬	2回以内
アディオソ乳剤	アブラムシ類、アズキノメイガ	2000~3000倍	9月中・下旬	3回以内
コテツフロアブル	ハダニ類	2000倍	収穫3日前まで	2回以内
スミチオン乳剤	カメムシ類、マメヒサヤムシカ、フキノメイガ	1000倍	9月上・中旬	4回以内
トレボン乳剤	メイガ類、カメムシ類	1000倍	8月中旬	あわせて 2回以内
トレボン粉剤		4kg/10a	9月中・下旬	
ジマンダイセン水和剤	さび病	400倍	収穫30日前まで	3回以内
ラウンドアップマックスロード	除草剤(播種前のみ)	500cc/10a	耕起前から播種前	2回以内
トレファノサイド乳剤	除草剤(播種直後)	300cc/10a	は種後発芽前	1回
トレファノサイド粒剤		6kg/10a	は種後発芽前	1回
バスタ液剤	雑草生育期(は種前又は畦間処理)	300~500cc/10a	収穫28日前まで	3回以内

◆施肥記録

肥料名	施用月日	施用量	備考
堆肥	月 日	kg	
アヅミン	月 日	kg	
粒状苦土石灰	月 日	kg	
大納言小豆化成550	月 日	kg	
NK化成2号(追肥)	月 日	kg	
ハイケルブ(液肥)	月 日	ℓ	
豆蔵	月 日	kg	
	月 日	kg	
	月 日	kg	
	月 日	kg	
	月 日	kg	
	月 日	kg	
	月 日	kg	
	月 日	kg	
	月 日	kg	

◆防除記録

薬剤名	防除月日	防除月日	希釈倍率	使用量	備考(病害虫発生状況)
キヒゲンR-2フロアブル	月 日	月 日	倍		
ダイアジノン粒剤	月 日	月 日	倍		
フェニックス顆粒水和剤	月 日	月 日	倍		
アディオソ乳剤	月 日	月 日	倍		
コテツフロアブル	月 日	月 日	倍		
スミチオン乳剤	月 日	月 日	倍		
トレボン乳剤	月 日	月 日	倍		
トレボン粉剤	月 日	月 日	倍		
ジマンダイセン水和剤	月 日	月 日	倍		
ラウンドアップマックスロード	月 日	月 日	倍		
トレファノサイド乳剤	月 日	月 日	倍		
トレファノサイド粒剤	月 日	月 日	倍		
バスタ液剤	月 日	月 日	倍		
	月 日	月 日	倍		
	月 日	月 日	倍		