平成　　年度

提出日　平成　　年　　月　　日

【 丹波黒大豆枝豆 栽培履歴】 枝豆用

氏　名：（　　）

住 所：（丹波市　　町　　）TEL（　　－　　）

確認月日	担当者名	確認印	検印	検印
月　日				

圃場面積	a	圃場地番	

◆作業履歴

作業名	作業月日	備　考
圃場準備	月　日	
は種	月　日	
定植	月　日	
摘芯	月　日	
支柱立て	月　日	
中耕培土	月　日	
	月　日	
	月　日	
	月　日	
	月　日	

◆防除基準

薬剤名	対象病害虫	使用基準（JA丹波ひかみ特産物栽培ごよみより）		
		希釈倍率・使用量	収穫前日数	使用回数
カルホス微粒剤F	タネバエ（直播のみ）	6kg／10a	は種時のみ	1回
スミチオン乳剤	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ	1000倍	21日前まで	4回
アグロスリン乳剤	ｶﾒﾑｼ類、ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ	2000倍	7日前まで	3回
トレボン乳剤	ﾒｲｶﾞ類、ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ、ｶﾒﾑｼ類	1000倍	14日前まで	2回
ダニトロンフロアブル	ハダニ類	1000倍	7日前まで	1回
ランマンフロアブル	茎疫病、ベト病	1000倍	3日前まで	3回
バスタ液剤	雑草生育期：畦間処理	原液300～500ml	14日前まで	3回

◆施肥記録

肥料名	施用月日	施用量	備　考
堆肥	月　日	kg	
アヅミン	月　日	kg	
粒状苦土石灰	月　日	kg	
BMようりん	月　日	kg	
黒大豆特号	月　日	kg	
PK化成40号	月　日	kg	
NK化成2号	月　日	kg	
けいふん	月　日	kg	
ハイケルプ	月　日	kg	
	月　日	kg	
	月　日	kg	
	月　日	kg	
	月　日	kg	

◆防除記録

薬剤名	防除月日	防除月日	希釈倍率	使用量	備　考（病害虫発生状況）
カルホス微粒剤F	月　日	月　日	倍		
スミチオン乳剤	月　日	月　日	倍		
アグロスリン乳剤	月　日	月　日	倍		
トレボン乳剤	月　日	月　日	倍		
ダニトロンフロアブル	月　日	月　日	倍		
ランマンフロアブル	月　日	月　日	倍		
バスタ液剤	月　日	月　日	倍		
	月　日	月　日	倍		
	月　日	月　日	倍		
	月　日	月　日	倍		
	月　日	月　日	倍		
	月　日	月　日	倍		
	月　日	月　日	倍		