

平成 年度

【山の芋 栽培履歴】

氏名：()

提出日 平成 年 月 日

住所：(丹波市) TEL(-)

圃場面積	a	圃場地番	
------	---	------	--

◆作業履歴

作業名	作業月日	備考
圃場準備	月 日	
種いも準備	月 日	
植え付け	月 日	
除草	月 日	
支柱立て	月 日	
蔓の配置・除けつ	月 日	
	月 日	
	月 日	
	月 日	
	月 日	
	月 日	
	月 日	

◆施肥記録

肥料名	施用月日	施用量	備考
堆肥	月 日	kg	
アヅミン	月 日	kg	
石灰窒素	月 日	kg	
苦土石灰	月 日	kg	
BMようりん	月 日	kg	
ケイフン	月 日	kg	
CDU燐加安S555	月 日	kg	
ハイクラス	月 日	kg	
NK化成2号	月 日	kg	
	月 日	kg	
	月 日	kg	
	月 日	kg	
	月 日	kg	

確認月日	担当者名	確認印	検印	検印
月 日				

◆防除基準

薬剤名	対象病虫害	使用基準(JA丹波ひかみ特産物栽培ごよみより)		
		希釈倍率・使用量	使用時期	使用回数
ラビライト水和剤	炭疽病・葉渋病	400倍	収穫14日前まで	4回以内
トップジンM水和剤	炭疽病・葉渋病	800倍	収穫7日前まで	5回以内
ジマンダイセン水和剤	炭疽病・葉渋病	400~600倍	収穫21日前まで	4回以内
ベルコート水和剤	葉渋病	1000~2000倍	収穫7日前まで	5回以内
アディオン乳剤	アブラムシ・ヤマノイモコガ・アザミウマ類	2000~3000倍	収穫7日前まで	5回以内
トレボン乳剤	アブラムシ類・ヤマノイモコガ・ハスモンヨトウ	1000倍	収穫14日前まで	3回以内
コロマイト乳剤	ハダニ類	1000倍	収穫7日前まで	2回以内
コテツフロアブル	ハダニ類	2000倍	収穫前日	2回以内
カイタック乳剤	1年生雑草	400~600ml	植付直後~萌芽前	1回以内
ベルコートフロアブル	青かび病	200倍	植付前10分間浸漬	1回以内
ダイアジノンゾル	コガネムシ類幼虫	25倍 100l	植付前	1回以内

◆防除記録

薬剤名	防除月日	防除月日	希釈倍率	使用量	備考(病虫害発生状況)
ラビライト水和剤	月 日	月 日	倍		
トップジンM水和剤	月 日	月 日	倍		
ジマンダイセン水和剤	月 日	月 日	倍		
ベルコート水和剤	月 日	月 日	倍		
アディオン乳剤	月 日	月 日	倍		
トレボン乳剤	月 日	月 日	倍		
コロマイト乳剤	月 日	月 日	倍		
コテツフロアブル	月 日	月 日	倍		
カイタック乳剤	月 日	月 日	倍		
ベルコートフロアブル	月 日	月 日	倍		
ダイアジノンゾル	月 日	月 日	倍		
	月 日	月 日	倍		
	月 日	月 日	倍		
	月 日	月 日	倍		