

# 雑草防除はこれで決まり!

## 除草剤の効かせ方のポイント!

- ①代かきは均平にならしましょう。
- ②使用適期を守りましょう!
- ③水管理をきっちりおこないましょう。

### 雑草防除基準

#### ①特別栽培米夢たんば

| 薬剤名   | 散布量                     | 散布適期   | 薬剤の特長・散布上の注意  |
|---|-------------------------|--|---|
| ジェイフレンド1キロ粒剤 又は ジェイフレンドフロアブル 又は ジェイフレンドジャンボ | 1kg<br>500ml<br>10パック   | 移植時、移植後～ノビエ3葉期<br>頃し、移植後30日まで<br>移植後5日～ノビエ3葉期<br>頃し、移植後30日まで | ノビエを始め、一<br>灌水状態のまま、<br>しをしないでく<br>年生雑草から多年生雑草まで幅広く安定した効果と長期残効性を持つ一発処理除草剤です。<br>田面に均一に散布し少なくとも3～4日間は灌水状態を保ち、散布後7日間は落水やかけ流しをしないでください。1キロ粒剤は移植直後から、フロアブルとジャンボ剤は移植後5日から使用可能です。 |
| クリンチャーバスME液剤                                | 1000ml<br>(希釈水量70～100ℓ) | 移植後15日～ノビエ5葉期まで<br>頃し、収穫50日前まで                               | 散布前に落水し、<br>後7日間は、落水、<br>水の出入りを止めて散布する。散布後は少なくとも3日間はそのままの状態を保ち、散布<br>かけ流しはしないでください。雑草の発生しているところへのスポット処理が効果的。  |



#### ②丹波ひかみ米コシヒカリ

|                |       |   |  |
|----------------|-------|---|--|
| トップガンGT1キロ粒剤51 | 1kg   | 移植直後～ノビエ3葉期<br>頃し、移植後30日まで<br>(移植後7日が目安)    | 灌水状態のまま田<br>流しはしないでく<br>移植直後から使用<br>面に均一に散布し、少なくとも3～4日間は灌水状態を保ち、散布後7日間は、落水、かけ<br>流しはしないでください。  |
| トップガンLフロアブル    | 500ml | 移植直後～ノビエ3葉期<br>頃し、移植後30日まで<br>(移植後7日が目安)    | 幅30m以下の水田<br>少なくとも3～4日<br>移植直後から使用<br>では、畦畔からの散布で処理が可能。散布前にはボトルを軽く振る。<br>間は、灌水状態を保ち、散布後7日間は、落水、かけ流しはしないでください。<br>可能です。               |
| トップガンLジャンボ     | 10パック | 移植後3日～ノビエ2.5葉期<br>頃し、移植後30日まで<br>(移植後7日が目安) | やや深めの灌水状<br>落水、かけ流しはし<br>葉や浮き草が発生<br>態(5～6cm)で散布し、散布後少なくとも3～4日間は灌水状態を保ち、散布後7日間は、<br>ないでください。<br>している場合は、拡散が阻害され薬害が発生する恐れがあるので使用をさける。 |

|                            |                              |              |   |   |
|----------------------------|------------------------------|--------------|---|---|
| 田植後体系処理<br>悪水も<br>いち<br>田の | ショキニーフロアブル<br>+              | 500ml        | 移植直後～ノビエ1葉期<br>頃し、移植後30日まで                                    | 散布に当たっては<br>～5cm程度)を保<br>水の出入りを止めて灌水のまま散布し、少なくとも3～4日間は通常の灌水状態(水深3<br>ち、散布後7日間は、落水、かけ流ししないでください。 |
|                            | マメットSM1キロ粒剤 又は<br>マメットSMジャンボ | 1kg<br>20パック | 移植後15日～30日まで<br>(ノビエ3.5葉期まで)<br>移植後20日～30日まで<br>(ノビエ3.5葉期まで)  | 極端な浅植え、活<br>をひかえる。<br>着の悪い田、散布後、急激に水温が上昇することが予想される時には薬害の恐れがあるので散布                               |
|                            | ショキニーフロアブル<br>+              | 500ml        | 移植直後～ノビエ1葉期<br>頃し、移植後30日まで                                    | 散布に当たっては<br>cm程度)を保ち、<br>水の出入りを止めて灌水のまま散布し、少なくとも3～4日間は通常の灌水状態(水深3～5<br>散布後7日間は、落水、かけ流ししないでください。 |
|                            | ガンガン1キロ粒剤 又は<br>ガンガンジャンボ     | 1kg<br>20パック | 移植直後～ノビエ3葉期<br>頃し、移植後30日前まで<br>移植後3日～ノビエ2.5葉期<br>頃し、移植後30日前まで | 強力な2成分で、<br>ノビエや多年生雑草に高い効果があり長期間抑えます。   |

|    |              |                         |                                |  |
|----|--------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| 後期 | クリンチャーバスME液剤 | 1000ml<br>(希釈水量70～100ℓ) | 移植後15日～ノビエ5葉期まで<br>頃し、収穫50日前まで | 散布前に落水し、<br>後7日間は、落水、<br>水の出入りを止めて散布する。散布後は少なくとも3日間はそのままの状態を保ち、散布<br>かけ流しはしないでください。雑草の発生しているところへのスポット処理が効果的。 |
|----|--------------|-------------------------|--------------------------------|--|

#### ☆クログワイ・ホタルイ・コナギ対策

|                 |            |       |                                |  |   |   |
|-----------------|------------|-------|--------------------------------|--|---|---|
| ショキニーフロアブル<br>+ | ハイカット1キロ粒剤 | 500ml | 移植直後～ノビエ1葉期<br>頃し、移植後30日まで     | クログワイ、ホタ<br>る圃場では、これ<br>薬剤で体系的な防<br>収穫後、雑草が黄<br>アップマックスロー<br>し、2週間程度おい<br>ルイ、コナギ等の難防除雑草が発生す<br>らの雑草に対してすぐれた効果のある<br>除が効果的です。<br>化する前(9月中旬～10月)にラウンド<br>D(薬量、500～1000ml/10a)を散布<br>てからすき込むとより効果的。 |  |  |
|                 |            | 1kg   | 移植後15日～ノビエ3.5葉期<br>頃し、収穫50日前まで |  |   |   |

※水もちの悪い水田では、フロアブル剤・ジャンボ剤の使用はさけて下さい。また、使用時は、灌水状態はやや深め(水深5～6cm)で散布して下さい。

### 水稲初期除草剤の使用時期に注意してください

移植前や播種前に農薬を使用する場合は、  
7日前までに行いましょう



水稲初期除草剤の移植前、播種前の使用時期  
が登録変更されています(平成24年8月より)

水稲初期除草剤の使用時期は、これまで「種代後(時)～移植4日前まで」「代かき後(時)～播種4日前まで」の適用がありました。これからは、移植や播種前に使用する場合は、移植または播種の「前日～6日間」の間は、初期除草剤は散布できません。  
新しく使用した場合は農薬取締法の違反であり、罰則の対象となりますので必ず守ってください。  
※ドレコット乳剤は播種4日前まで(平成25年11月変更)

※表記の播種は、直播栽培を示しております。

(10a当たり)